

Dactyladenia smeathmannii (Baill.) Prance & F. White (Chrysobalanaceae)

Niveau de menace UICN : En Danger

Description : Petit arbre à 10 m de haut avec plusieurs troncs, troncs à 15 cm diamètre. Tiges parfois lianescente. Feuilles un peu rugueux, avec quelques poils longs sur le nervure principal et secondaires au-dessous. Inflorescences à 15 cm de long, bractées avec 1-2 paires des glandes à longue tiges à la base. Bractéoles avec 5-7 paires des glandes à longue tiges. Réceptacle et sépales glabre à l'extérieur. Fruits ovales environ 3 x 2.5 x 2.5 cm, jaune verdâtre devenir marron à maturité.

Saison de floraison : Juin en Guinée (Nov. à Déc. en Liberia et Sierra Leone)

Saison de fructification : janvier à mars

Remarques importantes : Les fleurs de *Dactyladenia whytei* aussi présent en Guinée peut être distinguée par les inflorescences plus courtes 1-3 cm. *D. smeathmannii* a des inflorescences de 5 à 15 cm de long.

Habitat : Forêt galleries, en Liberia elle est aussi connue des forêts secondaires.

Menaces : Coupe de bois abusive pour le charbon.

Distribution : Guinée, Sierra Leone et Liberia.

Récoltes en Guinée :

Récolteur	Numéro	Date	Latitude	Longitude	Localité
Cheek, M.	18305	02/02/2016	9.7495	-13.3618	Coyah préfecture, Pont Kaka
Cheek, M.	18396	03/06/2016	9.748444	-13.3633	Coyah préfecture, Pont Kaka
Molmou D.	1519	04/01/2017	9.766111	-13.3009	Coyah préfecture. 3.9 km de Saliya, 4.7 km de Yataraya

Photos :





Photos by © Xander van der Burgt.

